レジメン名　：　DOC療法

疾患名　：　乳がん

投与間隔（1コース期間）　：21日間

総コース数　：　術前・術後　4コースまで
再発・転移　PDになるまで

特記事項　：

	投与順序	レジメン内容（医薬品名）	投与量	単位（mg/㎡,V等）	投与方法（手技）	投与時間（速度等）	投与日(Day1等)	備考（内服薬の用法等）
Rp.	1	生理食塩液100mL	1	本	点滴静注	ルート確保用	D1	ルート確保用
		生理食塩液50mL	1	袋				
	2	デキサート注射液6.6mg	1	瓶	点滴静注	15分	D1	
		ドセタキセル	60	mg/㎡		60分		
	3	生理食塩液　250mL	1	袋	点滴静注		D1	
	4	生理食塩液　50mL	1	本	点滴静注	15分	D1	

減量基準

減量規定（副作用名等）	減量条件（検査値等）	抗癌剤名	減量割合等（減量後の割合又は投与量）

参考文献

①Sparano JA, et al : Weekly paclitaxel in the adjuvant treatment of breast cancer. N Engl J Med, 2008; 358; 1663-167
・Chan S, et al : Prospective randomized trial of docetaxel versus doxorubicin in patients with metastatic breast cancer. J Clin Oncol, 1999; 17; 2341-2354
・がん化学療法ﾚｼﾞﾒﾝﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ　改定第5版