

レジメン名 : DOC+フェスゴ療法 3週毎

疾患名 : HER2陽性乳がん

投与間隔 (1コース期間) : 21日

総コース数 : 手術不能または再発:PDまで  
術前術後:4コース

特記事項 :

| 投与順序 | レジメン内容 (医薬品名) | 投与量 | 単位 (mg/m <sup>2</sup> , V等) | 投与方法 (手技) | 投与時間 (速度等) | 投与日 (Day1等) | 備考 (内服薬の用法等)                      |
|------|---------------|-----|-----------------------------|-----------|------------|-------------|-----------------------------------|
| Rp.  | 1 フェスゴIN      | 15  | mL/body                     | 皮下注       | 8分         | D1(初回)      |                                   |
|      | 1' フェスゴMA     | 10  | mL/body                     | 皮下注       | 5分         | D1(2回目以降)   |                                   |
|      | 2 生理食塩液100mL  | 1   | 本                           | 点滴静注      |            | D1          | ルート確保用<br>初回30分、2回目以降<br>15分まで短縮可 |
|      | 生理食塩液50mL     | 1   | 本                           |           |            |             |                                   |
|      | 3 デキサート       | 6.6 | mg                          | 点滴静注      | 15分        | D1          |                                   |
|      | 4 生理食塩液50mL   | 1   | 本                           | 点滴静注      |            | D1          |                                   |
|      | ドセタキセル        | 60  | mg/m <sup>2</sup>           |           |            |             |                                   |
|      | 5 生理食塩液250mL  | 1   | 本                           | 点滴静注      | 60分        | D1          |                                   |
|      | 6 生理食塩液50mL   | 1   | 本                           | 点滴静注      | 15分        | D1          |                                   |

#### 減量基準

| 減量規定 (副作用名等) | 減量条件 (検査値等) | 抗癌剤名 | 減量割合等 (減量後の割合又は投与量) |
|--------------|-------------|------|---------------------|
|              |             |      |                     |
|              |             |      |                     |
|              |             |      |                     |

#### 参考文献

フェスゴ添付文書

Fixed-dose combination of pertuzumab and trastuzumab for subcutaneous injection plus chemotherapy in HER2-positive early breast cancer (FeDeriCa): a randomised, open-label, multicentre, non-inferiority, phase3 study (Lancet Oncol. 2021 Jan;22(1):85-97. doi: 10.1016/S1470-2045(20)30536-2. Epub 2020 Dec 21.)