レジメン名　：　フェスゴ療法 3週毎

疾患名　：　HER2陽性乳がん

投与間隔（1コース期間）　：　21日

総コース数　：　手術不能または再発：PDまで<br>術前術後：12か月まで

特記事項　：

| | 投与順序 | レジメン内容（医薬品名） | 投与量 | 単位（mg/㎡, V等） | 投与方法（手技） | 投与時間（速度等） | 投与日（Day1等） | 備考（内服薬の用法等） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp. | 1 | フェスゴIN | 15 | mL/body | 皮下注 | 8分 | D1(初回) | |
| | 1' | フェスゴMA | 10 | mL/body | 皮下注 | 5分 | D1(2回目以降) | |

**減量基準**

| 減量規定（副作用名等） | 減量条件（検査値等） | 抗癌剤名 | 減量割合等（減量後の割合又は投与量） |
|---|---|---|---|
| | | | |

**参考文献**


フェスゴ添付文書

Fixed-dose combination of pertuzumab and trastuzumab for subcutaneous injection plus chemotherapy in HER2-positive early breast cancer(FeDeriCa): a randomised, open-label, multicentre, non-inferiority, phase3 study ( Lancet Oncol . 2021 Jan;22(1):85-97. doi: 10.1016/S1470-2045(20)30536-2. Epub 2020 Dec 21.)