レジメン名　：　nab-PTX+GEM

疾患名　：　膵がん（外科）

投与間隔（1コース期間）　：28日間

総コース数　：　PDになるまで

特記事項　：

	投与順序	レジメン内容（医薬品名）	投与量	単位（mg/㎡,V等）	投与方法（手技）	投与時間（速度等）	投与日(Day1等)	備考（内服薬の用法等）
Rp.	1	生理食塩液　100mL	1	本	点滴静注		D1、D8、D15	ルート確保用
		ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴静注0.75m	1	袋				
	2	デキサート　6.6mg	1	瓶	点滴静注	15分	D1、D8、D15	
		アブラキサン	125	mg/㎡				1Vあたり20mLで溶解し、不要な溶液は破棄
	3	生理食塩液　100mL	1	本	点滴静注	30分	D1、D8、D15	
	4	生理食塩液　50mL	1	本	点滴静注	15分	D1、D8、D15	
		ゲムシタビン	1000	mg/㎡				
	5	5%ブドウ糖液　100mL	1	本	点滴静注	30分	D1、D8、D15	
	6	生理食塩液　50mL	1	本	点滴静注	15分	D1、D8、D15	
		ゲムシタビンの5%ブドウ糖液への溶解は、血管痛の出現があり、生理食塩液とブドウ糖液ではブドウ糖液の方が血管痛が						
		少なかったとの報告もあるため、溶解液として使用している。						

減量基準

減量規定（副作用名等）	減量条件（検査値等）	抗癌剤名	減量割合等（減量後の割合又は投与量）

参考文献

①Von Hoff DD, et al. Increased survival in pancreatic cancer with nab-paclitaxel plus gemcitabine. N Engl J Med. 2013; 369; 1691-703

・Ueno H, et al. Phase I/II study of nab-paclitaxel plus gemcitabine for chemotherapy-naive Japanese patients with metastatic pancreatic cancer. Cancer Chemother Phatmacol. 2016; 77; 595-603