レジメン名　：パドセブ+キイトルーダ療法
疾患名　：尿路上皮癌
投与間隔（1コース期間）　：21日間
総コース数　：PDまで
特記事項　：

	投与順序	レジメン内容（医薬品名）	投与量	単位（mg/㎡,V等）	投与方法（手技）	投与時間（速度等）	投与日(Day1等)	備考（内服薬の用法等）
Rp.	1	生食100mL	1	本	点滴静注		D1、D8	フィルター付きセットを使用すること
		生理食塩液　100mL	1	本				
	2	デキサート　6.6mg	1	瓶	点滴静注	15分	D1、D8	
		ﾊﾄﾞｾﾌﾞ	1.25	mg/kg				
		注射用水20mL	1	本				
	3	生食50mL	1	本	点滴静注	30分	D1、D8	
	4	生食50mL	1	本	点滴静注		D1、D8	フラッシュ用
		ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ	200	mg/body				
	5	生食100mL	1	本	点滴静注	30分	D1	
	6	生理食塩液50mL	1	本	点滴静注		D1	フラッシュ用

減量基準

減量規定（副作用名等）	減量条件（検査値等）	抗癌剤名	減量割合等（減量後の割合又は投与量）
皮膚障害 角膜障害 高血糖 末梢性ﾆｭｰﾛﾊﾟﾁｰ 血小板減少 間質性肺炎	Gr2	ﾊﾟﾄﾞｾﾌﾞ	Gr1以下に回復するまで休薬
上記以外	Gr3		

参考文献

Enfortumab Vedotin snd Pembrolizumab in Untreated Advanced Urothelial Cancer