レジメン名　：　sLV5FU2+BV（5mg/kg）2週毎（ﾎﾟﾝﾌﾟ）

疾患名　：　大腸がん

投与間隔（1コース期間）　14日間

総コース数　：　PDになるまで

特記事項　：

	投与順序	レジメン内容（医薬品名）	投与量	単位（mg/㎡, V等）	投与方法（手技）	投与時間（速度等）	投与日（Day1等）	備考（内服薬の用法等）
Rp.	1	生食100mL	1	瓶	点滴静注・メイン	15分	Day1	ルート確保用
	2	生食50mL	1	袋	点滴静注・メイン	15分	Day1	
		デキサート6.6mg	1	瓶				
	3	ベバシズマブ	5	mg/kg	点滴静注・メイン		Day1	初回90分、2回目60分、3回目以降30分まで短縮可
		生理食塩液　100mL	1	本				
	4	5%ブドウ糖　250mL	1	袋	点滴静注・メイン	2時間	Day1	
		レボホリナート	200	mg/㎡				
	5	フルオロウラシル	400	mg/㎡	点滴静注・メイン	急速静注	Day1	レボホリナート終了後、全開で投与
		生食　50mL	1	本				
	6	フルオロウラシル	2400	mg/㎡	インヒューザーポンプ	46時間	Day1	ボーラスのフルオロウラシル終了後46時間で投与 全量140mLとする
		生食100mL	1	本				
	7	生食シリンジ20mL	1	本	点滴静注・メイン		Day3	持続のフルオロウラシル終了後使用、フラッシュ用

減量基準

減量規定（副作用名等）	減量条件（検査値等）	抗癌剤名	減量割合等（減量後の割合又は投与量）

参考文献

①大腸癌治療ガイドライン　医師用　2019年版
②制吐薬適正使用ガイドライン2015年10月（第2版）
③改訂第6版がん化学療法レジメンハンドブック